

Сведения о заместительной терапии препаратом Substitol® retard в виде капсул *Риски для здоровья*

Капсулы Substitol® retard представляют собой лекарственный препарат, содержащий действующее вещество морфин и применяемый перорально для заместительной терапии опиоидной зависимости. Препарат позволяет контролировать зависимость, однако при неправильном применении может представлять опасность для жизни. Запрещено давать капсулы детям и лицам, не достигшим 18 лет.

Способ применения: проглатывание капсул

Капсулы Substitol® retard можно принимать **только перорально**, то есть через рот, целиком, запивая достаточным количеством воды, при этом общая доза употребляется за один прием (**по возможности с интервалом в 24 часа между приемами**).

По специальному распоряжению врача фармацевт может выдавать содержимое капсулы, высыпанное в стаканчик, вместе со стаканом воды или смесь содержимого капсулы с водой.

Любое иное применение может причинить вред здоровью и опасно для жизни!

При внутривенном введении, то есть при инъекции растворенного содержимого капсулы, существует риск:

- передозировки со смертельным исходом вследствие остановки дыхания;
- заражения опасными для жизни инфекционными заболеваниями (такими как гепатит В и С, ВИЧ/СПИД);
- повреждения кровеносных сосудов и тканей.

Дозировка: как правильно подобрать дозу?

Правильно подобранная доза — это та доза, при которой не проявляется абстинентный синдром и подавляется желание употреблять наркотики. Честно сообщите своему врачу, при какой дозе препарата Substitol® у вас снимается абстинентный синдром. Слишком высокая доза опасна и способствует чрезмерной заторможенности (избыточной седации).

Врать врачу, сообщая ему не соответствующую действительности дозу, означает подвергать себя и других смертельной опасности!

Рост толерантности: привыкание

При регулярном приеме организм привыкает к средству заместительной терапии. Для лиц, не испытывающих зависимости от опиоидов, морфин может оказаться смертельным даже в малой дозе и при первом применении! **Испытывать на себе действие препарата опасно для жизни!**

Потребление других средств во время лечения: внимание, опасно для жизни!

Вместе с капсулами Substitol® retard НЕЛЬЗЯ бесконтрольно принимать снотворно-седативные средства (например, бензодиазепины), анальгетики, анксиолитики и антидепрессанты (то есть другие лекарственные средства, которые не назначал лечащий врач).

Одновременный прием указанных средств может иметь последствия с угрозой для жизни!

Потребление алкоголя в период заместительной терапии повышает риск передозировки и возникновения паралича дыхания.

Передача средства заместительной терапии другим лицам: карается законом

Запрещается передавать медицинское средство заместительной терапии другим лицам даже в бескорыстных целях. **Нарушая это правило, вы подвергаете опасности других людей и совершаете преступление!** Помимо наступления наказания, всегда существует риск серьезного инцидента с летальным исходом.

Черный рынок: опасность фальсификации

Предлагаемые на черном рынке капсулы могут не соответствовать лекарственному средству, которое выписывает врач. Их состав может быть иным.

Хранение

Всегда храните средство заместительной терапии в надежном и недоступном для других месте.

Храните средство в недоступном для детей месте!

Подозрение на передозировку: что делать в экстренном случае?

В случае подозрения ВСЕГДА обращайтесь за помощью и звоните в службу спасения по номеру 144!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте своим знакомым просто «проспать», если у них отсутствует реакция на раздражители, то есть когда они вообще не реагируют, если их сильно ущипнуть за мочку уха! Вызовите скорую медицинскую помощь, если у ваших знакомых ухудшилось состояние (например, дыхание стало поверхностным), наблюдается помрачение сознания или если они находятся в бессознательном состоянии! Врачу скорой медицинской помощи или санитарам крайне важно знать, что именно и в каких количествах потребляли вы и ваши знакомые!

При приеме капсул Substitol® retard всегда точно соблюдайте указания лечащего врача.

При возникновении вопросов обращайтесь к лечащему врачу или фармацевту.

Редакция 3 от 11.03.2019 г.
Идент. № EM-SUB-AT-01

Инструкция по применению по состоянию на: январь 2019 г.

